

 **Perfiles en vuelo de la aves rapaces comunes de Madrid**

		
Buitre leonado (<i>Gyps fulvus</i>)	Buitre negro (<i>Aegypius monachus</i>)	Alimoche (<i>Neophron percnopterus</i>)
		
Quebrantahuesos (<i>Gypaetus barbatus</i>)	Milano real (<i>Milvus milvus</i>)	Milano negro (<i>Milvus migrans</i>)
		
Elanio azul (<i>Elanus caeruleus</i>)	Aguilucho cenizo (<i>Circus pygargus</i>)	Aguilucho pálido (<i>Circus cyaneus</i>)
		

(Word to PDF - Unregistered) <http://www.word-to-pdf.abdio.com/>

<i>Aguilucho lagunero occ (Circus aeruginosus)</i>	<i>Halcón abejero (Pernis apivorus)</i>	<i>Busardo ratonero (Buteo buteo)</i>
		
<i>Águila real (Aquila chrysaetos)</i>	<i>Águila imperial (Aquila adalberti)</i>	<i>Águila-az perdicera (Hieraetus fasciatus)</i>
		
<i>Aguililla calzada (Hieraetus pennatus)</i>	<i>Culebrera europea (Circaetus gallicus)</i>	<i>Águila pescadora (Pandion haliaetus)</i>
		
<i>Azor (Accipiter gentilis)</i>	<i>Gavilán (Accipiter nisus)</i>	<i>Esmerejón (Falco columbarius)</i>
		
<i>Cernicalo vulgar (Falco tinnunculus)</i>	<i>Cernicalo primilla (Falco naumanni)</i>	<i>Alcotán (Falco subbuteo)</i>



Identificación de las rapaces por su silueta

Silueta	Grupo - Descripción
	B u i t r e s : Tamaño muy grande, alas enormes, rectas y muy anchas, cola corta.
	A l i m o c h e : Tamaño grande, cola triangular.
	A g u i l a s : Tamaño mediano a grande, alas largas y anchas, pero no tanto como los buitres ni tan rectas, cola ligeramente larga mayor que la de los buitres (el águila pescadora, tiene un aspecto peculiar).
	R a t o n e r o : Tamaño mediano, alas anchas y cortas, y cola ancha.
	A c c i p í t e r e s : Tamaño mediano, alas anchas y cortas, y cola larga.
	M i l a n o s : Tamaño mediano, alas largas y cola larga ahorquillada.
	A g u i l u c h o s : Tamaño y silueta bastante similar a los milanos, pero de tamaño algo menor y la cola no es ahorquillada.
	H a l c o n e s : Tamaño pequeño a mediano, alas puntiagudas y cola larga.

[Veamos algunas características básicas de los diferentes grupos:](#)

- **Buitres:** las alas son enormes y característicamente rectangulares, tienen una cola corta y un poco en abanico. El quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*) tiene una silueta característica y específica.
- **Alimoche:** tiene las alas blancas bordeadas de negro y una cola triangular.
- **Águilas:** las alas son largas y anchas pero no son tan rectangulares como las de los buitres. Su cola es ligeramente larga. El águila pescadora (*Pandion haliaetus*) no es considerada un águila en sentido estricto y al igual que el quebrantahuesos tiene una silueta específica.
- **Halcones:** en este grupo englobamos halcones, alcotanes, elanios y cernícalos, es decir todas las especies pertenecientes a los géneros *Falco* y *Elanus*. Son aves de pequeño a mediano tamaño, tienen unas alas puntiagudas y una cola larga.
- **Milanos:** son de tamaño mediano, tienen unas alas largas y quizá lo que los distinga claramente del resto sea su característica cola ahorquillada.
- **Ratonero o Busardo:** posee unas alas anchas y cortas y una cola larga.
- **Accipíteres:** en este grupo se encuentran los azores y los gavilanes, es decir las especies pertenecientes al género *Accipiter*. Tienen las alas cortas y anchas y una cola larga.
- **Aguiluchos:** Poseen un tamaño y una silueta semejante a la de los milanos pero en vez de cola ahorquillada la tienen recta.

Jorge Calvo Ganzabal